


KLASSIFISERING AV TRYKKSÅR




Kategori/Stadium 1:

Intakt hud med rødhet som ikke blekner på et lokalisert område, ofte over et benfremspring. Området kan være smertefult, fast, bløtt, varmere eller kaldere sammenlignet med nærliggende vev. Kategori 1 kan være vanskelig å oppdage på personer med en mørkere hudtone. Symptomene ovenfor kan antyde risiko for å utvikle trykksår.




Kategori/Stadium 2:

Delvis tap av dermis (lær huden) som ser ut som et overfladisk åpent sår med rød-rosa sårbunn, uten dødt vev. Kan også se ut som en intakt eller revnet serumfylt eller blodfylt blemme. Ser ut som et skinnende eller tørt overfladisk sår uten dødt vev eller blåmerker.



Kategori/Stadium 3:

Tap av hele hudlaget. Underhuds fett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke eksponert. Dødt vev kan forekomme, men skjuler ikke dybden av vevstap. Kan inkludere underminering og tunneldannelse.



Kategori/Stadium 4:

Gjennomgående tap av vev med eksponerte ben, sener eller muskulatur. Dødt vev eller sårskorpe kan forekomme. Omfatter ofte underminering og tunneldannelse. Kategori 4 trykksår kan omfatte muskel- og/eller støttestrukturer (f.eks. hinner, sener eller leddkapsel).

Dette utdraget er hentet fra "Pressure Ulcer Prevention and Treatment EPUAP Review guideline" som er skrevet av European Pressure Ulcer Advisory Panel (2009). Denne oversikten er utformet kun som en veiledning. Invacare er ikke ansvarlig for eventuell medisinsk feilvurdering som følge av feiltolkning av innholdet i dette dokumentet.